

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku, w nawiązaniu do dynamicznej sytuacji epidemiologicznej w województwie mazowieckim dotyczącej wzrostu zachorowań na krztusiec spowodowanych zakażeniem *Bordetella pertusis* przekazuje poniższe materiały graficzne w celu rozpowszechnienia u rodziców informacji na temat krztusca i roli szczepień w profilaktyce zakażeń pałeczkami *Bordetella pertusis*.



KRZTUSIEC CECHUJE SIĘ WYSOKĄ ZAKAŹNOŚCIĄ!



Zakażenie następuje drogą kropelkową.



Ok. 80% osób nieuodpornionych zakaży się po kontakcie z osobą zakażoną, w środowisku domowym.



Starsze dzieci, młodzież i osoby dorosłe przy skąpych lub nietypowych objawach choroby stanowią istotne źródło zakażenia dla niemowląt, dla których choroba jest najbardziej niebezpieczna.



Ani przechorowanie krztusca, ani szczepienie nie dają odporności na całe życie, dlatego po podstawowych szczepieniach w dzieciństwie konieczne są dawki przypominające u starszych dzieci, młodzieży i dorosłych.

SZCZEPIENIA PRZECIW KRZTUŚCOWI POTRZEBNE SĄ W KAŻDYM WIEKU



DTP/DTaP dla dzieci	Tdap dla nastolatków	Tdap dla kobiet w ciąży	Tdap dla dorosłych
2, 3-4, 5-6 miesiąc* 16-18 miesiąc* 6 lat*	14 lat* 19 lat**	27-36 tydz. ciąży**	1 dawka co 10 lat**

* szczepienie obowiązkowe (bezpłatne); **szczepienie zalecane (odpłatne)

KRZTUSIEC (KOKLUSZ, 100-DNIOWY KASZEL)

szczeniainfo



CZYNNIK

pateczka krztusca i jej toksyny
namnaża się w drogach oddechowych



OBJAWY

Typowy
krztusiec
6-10 tyg.



NIEMOWLĘTA I MAŁE DZIECI

- o niewysoka gorączka
- o katar
- o kaszel
- o kaszel napadowy z „pianiem”
- o sinica
- o bezdechy



STARSZE DZIECI I OSOBY DOROSŁE

- o uporczywy i napadowy kaszel

CIĘŻKI PRZEBIEG:

- o u niemowląt <6 miesięcy
- o u wcześniaków - bezdechy
- o u niemowląt nieszczepionych



POWIKŁANIA

NIEMOWLĘTA I MAŁE DZIECI

- o zapalenie płuc
- o drgawki
- o encefalopatia
- o zgon

STARSZE DZIECI I OSOBY DOROSŁE:

- o omdlenia
- o zaburzenia snu
- o nietrzymanie moczu i stolca
- o złamania żeber



PROFILAKTYKA



NIEMOWLĘTA I MAŁE DZIECI

szczepionki
DTP / DTaP / „5w1” / „6w1”

ODPORNOŚĆ POSZCZEPIENNA
ZMNIĘJSZA SIĘ Z CZASEM, KONIECZNE
SĄ DAWKI PRZYPOMINAJĄCE!



MŁODZIEŻ I DOROŚLI

dawki przypominające
szczepionki Tdap



KOBIETY W CIĄŻY

szczepionka
Tdap

EPIDEMIOLOGIA

ZACHOROWANIA

POLSKA:

2000-3000
zachorowań/rok

ŹRÓDŁO ZAKAŻENIA

- o chory człowiek
- o 1 człowiek może zakażać 15 osób
- o maksymalna zakaźność w pierwszych 2 tyg. choroby (utrzymuje się do 5 tyg.)

DROGI ZAKAŻENIA



kropelkowa
lub bezpośredni
kontakt

90% podatności
na zakażenie

Ministerstwo
Zdrowia



Sprawdź → [Szczeniainfo](https://szczeniainfo.pl)

Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.